LONDRIVET

CATÁLOGO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

SANTA CATARINA

Linha DISTRIBUIÇÃO

SANTA CATARINA

LONDRIVET

ADE-TEC
500ml

Fórmula (cada 100ml contém)

Ivermectina ..... 1,00 g
Vitamina A ..... 25.000.000 UI
Vitamina D ..... 3 7.000.000 UI
Vitamina E ..... 5.000 UI
Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

Dosagem
Bovinos: 1ml para 50kg de peso corporal.

AMOCLOX S
5,5gr

Princípio(s) Ativo(s)
Cloxacilina, Amoxicilina.

Modo de usar
Aplicar o conteúdo de uma seringa por quarto mamário, após ser efetuada uma completa secagem e desinfecção do canal do teto, com freqüência a ser determinada pelo Médico Veterinário.

BEHAVIOR HORSE
4,5kg

Níveis de garantia

Cálcio(máx.) 156,0g/kg
Cálcio(mín.) 136,00g/kg
Fósforo(mín. .....)40,00g/kg
L-lisina(mín.) 3900,00mg/kg
Magnésio(mín.) 30,00g/kg
Flúor(máx.) 400,00mg/kg

Dosagem
Animais adultos: 150 gramas por dia (2x de 75g).
Animais jovens: 120 gramas por dia (2x de 60g).
Puro ou na ração

CEFAVET
10ml

Princípio(s) Ativo(s)
Cefoperazone sódico, Prednisolona acetato.

Dosagem
Bovinos: Aplicar o conteúdo de uma seringa em cada teto infeccionado.

COMBO POUR ON
1Lt

Princípio(s) Ativo(s)
Cipermetrina, Clorpirifós e Piperonila.

Dosagem
Bovinos: Aplicar 10ml para 100kg de peso; no dorso do animal, do pescoço até a anca.

EKYFLOGIL
100ml

Princípio(s) Ativo(s)
Prednisolona (Acetato), Lidocaína (Cloridrato), Dimetilsulfóxido.

Modo de Usar
Aplicar (com luva plástica, ou pincel de cerdas macias) uma camada não muito espessa sobre a área afetada, duas a três vezes ao dia.

EPRECIS INJ
50ml - 500ml

Princípio(s) Ativo(s)

Cada 100 mL contém:
Eprinomectina ..... 2,00 g
Excipientes q.s.p. ..... 100,00 mL

Dosagem
Adose recomendada é de 0,2 mg de eprinomectina por Kg depeso vivo, em aplicação única, que corresponde a 1 mL para cada 100 Kg de peso vivo.

FERTCOR 5000 UI
2 ampolas

Fórmula (Cada ampola de liofilizado contém)

Ampola de liofilizado:
Gonadotrofina Coriônica Humana(HCG) 5.000UI
Manitol 20mg

Diluente:
Cloreto de sódio ..... 18 mg
Água para injetáveis ..... 2 mL

Dosagem
Éguas: 0,6 a 1,2ml (Indução de ovulação), via IM ou EV lenta.
Garanhões: 0,6 a 2ml (Criptorquidismo inguinal) por via IM ou EV lenta, 2x por semana.

FERTIGON 2000 UI
20ml

Princípio(s) Ativo(s)
Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG)

Dosagem
Indução da ovulação:
Éguas: 1,5 a 3,0ml (estro prolongado)
Vacas: 1,5 a 3,0ml (falta ou atraso da ovulação)
Porcas: 0,5 a 1,0ml (estro)
Ovelhas: 0,1 a 0,5ml (estro)

FLURON GOLD POUR ON
1Lt - 2Lt

Princípio(s) Ativo(s)
Cipermetrina, Fluazuron e Piperonila.

Dosagem
Bovinos: Uso tópico. Aplicar 10ml para 100kg de peso no dorso do animal.

GASTROZOL PASTA
7,5gr

Princípio(s) Ativo(s)
Omeprazol.

Dosagem
Equinos: Dose de 4 mg para 1kg por dia.

INDIGEST
30ml

Princípio(s) Ativo(s)
Membutona (sal dietanolamina)

Modo de usar
Bovinos adultos: 20 a 40ml e bezerros: 5 a 15ml, por via IM.
Equinos: 20ml, por via IV. Não usar em animais com hipertermia.

KETOFEN 10%
10ml - 50ml

Princípio(s) Ativo(s)
Ketoprofeno, Quetoprofeno.

Modo de usar
Bovinos: 3ml para 100kg de peso, via IM ou EV.
Equinos: 1ml para 45kg de peso, por via IM ou EV.
Suínos: 3ml para 100kg de peso, por via IM.

LUTEGLAN
50ml

Princípio(s) Ativo(s)
Cloprostenol

Modo de usar
Bovinos: 2ml/animal, por via IM.

MARBOX
50ml - 100ml

Princípio(s) Ativo(s)
Marbofloxacina.

Modo de usar
Bovinos e suínos: 8 mg de marbofloxacina/kg de peso vivo, que corresponde a 2 mL de Marbox para cada 25 kg de peso vivo.

PAIN-OXX 2D
14,64gr

Princípio(s) Ativo(s)
Firocoxibe.

Modo de usar
Equinos: admistra por via oral, seguindo a gradação da seringa. Um seringa (14,64gr) trata 1.200kg de peso corporal.

PRO-CICLAR 750MG
10un

Princípio(s) Ativo(s)
Progesterona Micronizada.

Modo de Usar
Calçar as mãos com luvas de látex. Introduzir o dispositivo no aplicador e desinfetar em solução de amônia quaternária 0,5%. Higienizar a região peri-vulvar da fêmea e aplicar o dispositivo intravaginalmente.

PURITEC 3.5 GOLD
500ml - 1Lt

Princípio(s) Ativo(s)
Ivermectina

Dosagem
Bovinos: 1ml para 50kg por dia.

RETARDOESTEROIDE
50ml

Formulação
Acetonido de Triancinolona

Dosagem
Bovinos: (vacas leiteiras) aplicar 10 mL por animal em dose única.
Equinos: 0,01 a 0,02 mL por Kg de peso, em dose única por via IM.

ROBOFORTE
100ml - 250ml

Princípio(s) Ativo(s)
Cálcio-fosforilcloreto de colina, Caseína-peptídeos, Vitamina B12 (cianocobalamina).

Dosagem
Equinos: Dose de 4 mg para 1kg por dia.

VACINA BOTULINOMAX
20ds - 50ds

Princípio(s) Ativo(s)
Suspensão de toxóides e bacterinas de Clostridium botulinum Tipos C e D; C. chauvoei; C. septicum; C. sordellii; C. perfringens Tipos B, C e D; C. novyi inativadas e adsorvidas em hidróxido de alumínio.

Dosagem
Bovinos: 5ml, por via SC.
Ovinos e caprinos: 2ml, por via SC.

VACINA TRI-EQUI
10x1ds

Formulação
Vacina composta pelos vírus da encefalomielite leste e oeste, toxóide tetânico e vírus da influenza equina tipos A1 e A2 (Kentucky, 92).

Modo de usar
Equinos: Na primovacinação, aplicar por via intramuscular 1ml do produto e repetir a dose após 28 dias da primeira dose. Revacinar anualmente.

VELACTIS
5ml

Princípio(s) Ativo(s)
Cabergolina.

Dosagem
Bovinos: 5ml por vaca, por via IM. (Único tratamento)

TILMICOVET
100ml

Princípio(s) Ativo(s)
Tilmicosina.

Modo de usar
Bovinos: A dose indicada é de 1 mL/30 Kg de p.v. por via SC. Repetir o tratamento após 72 horas.

VIVEDIUM
4 GR + Diluente 200ml

Principio(s) Ativo(s)
Cloreto de isometamidium

Modo de usar
Bovinos: 1ml para 20kg de peso. Após a diluição, aplicar por via IM, preferencialmente na "tábua" do pescoço. Usar a solução imediatamente após o seu preparo.

ZELERIS
100ml

Descrição
Trata rapidamente a infecção através do florfenicol, agindo no processo inflamatório, na febre e na dor, através do meloxicam.

Dosagem
Bovinos: 1ml a cada 10kg de peso corpóreo, em Dose única.

BOVITAM
50ml - 250ml -500ml

Descrição
Suplemento vitamínico e mineral injetável.

Dosagem
Bovinos: 10ml
Ovinos e caprinos: 2ml

BOVITAM ORAL GEL
40gr

Descrição
Suplemento citamínico mineral e aminoácido para bovinos.

Modo de usar
Animais jovens: via oral, 4g ao dia, por 7 dias.
Animais adultos: via oral, 10g ao dia, por 5 dias.

BOVITAM PÓ
1kg

Descrição
Premix mineral e vitamínico com aminoácidos.

Dosagem
No sal branco - 1kg para 25kg (3,5%)
No sal miniral - 1kg para 30kg (3%)
Na ração gado de corte - 3kg para 1000kg (0,3%)
Na ração gado de leite - 4kg para 1000kg (0,4%)
Trato - 5 a 15gr por animal/dia.

CALCION C/ EQUIPO
500ml

Princípio(s) Ativo(s)
Gluconato de cálcio, Glicerofosfato de sódio, Gloreto de magnésio

Dosagem
Bovinos: 200 a 250ml (Bezerros: 25 a 30ml).
Equinos: 200 a 250ml (Potros: 30 a 35ml).
Suínos: 35 a 40ml (Leitões: 3 a 5ml).
Ovinos e caprinos: 25 a 30ml.
Cães: 10 a 15ml.

DISPECTIN
50ml - 500ml - 1Lt

Princípio(s) Ativo(s)
Abamectina.

Dosagem
Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

EQUITAM ORAL
40gr

Princípio(s) Ativo(s)
Suplemento citamínico mineral e aminoácido..

Dosagem
Fornecer por via oral.
Equinos adultos: 40gr por animal.
Potros: 20gr por animal.

EQUITINA ORAL
35gr

Princípio(s) Ativo(s)
Ivermectina.

Dosagem
Equinos: 7gr para 100kg de peso.

IVERMAX
50x1ml

Princípio(s) Ativo(s)
Ivermectina.

Indicações
Para o tratamento e controle de parasitas internos e externos de bovinos.

Dosagem
Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

EQUITAM PÓ
5kg

Descrição
Suplemento vitamínico composto por uma combinação única de minerais orgânicos, inorgânicos e aminoácidos, e enriquecido com probióticos e dextrose.

Dosagem
Equinos Adultos: utilizar 50g ao dia.
Equinos Atletas: utilização no período de 45 a 60 dias antes das competições.
Potros: utilizar 25g ao dia.

GLICOVIT
1Lt

Descrição
Suplemento rico em aminoácidos, enriquecido com cromo orgânico e glicose, desenvolvido para auxiliar no ganho de massa dos equinos e na recuperação física após as provas e treinos.

Dosagem
Equinos: 25ml duas vezes ao dia por 14 dias.
Potros: 10ml duas vezes ao dia por 14 dias.

HEMOVIT
1Lt

Descrição
Suplemento líquido indicado para equinos adultos e potros nas diversas fases da vida, como gestação, lactação e no preparo de animais atletas.

Dosagem
Adultos: 15 ml/dia por14 dias.
Potros: 8 ml/dia por 14 dias.

IVERMAX
50x1ml - 50ml - 250ml - 500ml - 1Lt

Princípio(s) Ativo(s)
Ivermectina.

Indicações
Para o tratamento e controle de parasitas internos e externos de bovinos.

Dosagem
Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

IVERMAX-S
333gr

Princípio(s) Ativo(s)
Ivermectina.

Dosagem
Miturar por tonelada de ração pronta, para:
Animais até 40kg 333gr
41 a 70kg 400gr
71 a 100kg 450gr

IVERMAXX GOLD
50ml - 250ml - 500ml 1Lt

Princípio(s) Ativo(s)
Ivermectina.

Dosagem
Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

MINAVIT ADE
1kg

Níveis de garantia
BHT (mín.) ..... 300 mg/kg
Vitamina A (mín.) 15.000.000UI/kg
Vitamina D3 (mín.) 2.000.000UI/kg
Vitamina E (mín.) 26.000UI/kg

Dosagem
Bovinos: 10 a 20mg por dia

RUMEC ADB12
1kg

Princípio(s) Ativo(s)
Aditivo Probiótico, Antioxidante, Carbonato de Cálcio, Sulfato de Zinco, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobalto, Selenito de Sódio, Sulfato de Manganês, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D3.

Dosagem
Bovinos: No sal branco – Incluir na proporção de 3,5% ou 1 kg por saco de 25 kg.

TERRAMIN 400
100gr - 1kg

Princípio(s) Ativo(s)
Oxitetraciclina, Cobalto, Cobre.

Dosagem
Preventivo: 1,5kg para 25kg de sal comum.
Curativo: 2,5kg para 25kg de sal comum. (surto de doenças, geadas, secas ou brotação de pastagens).

WALTEC 10
250ml - 1Lt - 5Lt

Princípio(s) Ativo(s)
Albendazol.

Dosagem
Bovinos: 5ml para 50kg.
Ovinos e caprinos: 0,5ml para 10kg